

Uro-Vaxom 中文说明书



在您开始服用此药物之前，请仔细阅读整个药品说明书。由于您可能在以后再次阅读，因此请保留药品说明书。如果您有任何其他问题，请咨询您的医生或药剂师。此药物是根据您的个人情况开具的，不要将其提供给他人。即使这些人与您有相同的症状，它也可能会对他们造成伤害。如果您受到列出的任何副作用的严重影响，或者您注意到未在本使用说明中列出的副作用，请通知您的医生或药剂师。本包装说明书包括：

- 1.Uro-Vaxom 是什么，有什么用途？
- 2.在服用 Uro-Vaxom 之前需要注意什么？
- 3.如何服用 Uro-Vaxom？
- 4.可能出现哪些副作用？
- 5.如何存储 Uro-Vaxom？

1.URO-VAXOM 是什么，它有什么用途？

URO-VAXOM 是一种治疗尿路感染的免疫治疗药物。URO-VAXOM 用于治疗反复发作和慢性尿路感染，例如膀胱炎（膀胱炎），肾盂肾炎，尿道炎（尿道炎），尿液中存在细菌但没有症状（无症状性细菌尿）。URO-VAXOM 激活身体的各种防御机制（细胞和体液免疫），从而在泌尿系统区域引起免疫反应。

2.在服用 Uro-Vaxom 之前需要注意什么？

如果您对 E. coli（大肠杆菌及其亚群）分离物或 Uro-Vaxom 的其他成分过敏，则不得服用 Uro-Vaxom。儿童使用 Uro-Vaxom 在 2 岁以下的儿童中的有效性和安全性尚未得到研究。在服用 Uro-Vaxom 与其他药物时 如果您正在服用/使用其他药物，或最近服用/使用了其他药物，即使这些药物不需要处方，也请告知您的医生或药剂师。目前没有关于其他药物或疫苗的不良反应的信息。在口服活疫苗（含活菌）治疗前后应保持 2 周的间隔。服用抑制免疫功能的药物（免疫抑制剂）可能会影响 Uro-Vaxom 的疗效。抗生素/化疗药物和 Uro-Vaxom 的同时使用是可能的。请注意，这些信息也适用于最近使用的药物。怀孕和哺乳期 目前没有发现有害胚胎的（致畸）作用。因为在怀孕的前三个月没有对女性进行研究，

所以在怀孕的前三个月不应服用 Uro-Vaxom。

3.Uro-Vaxom 的用法是什么？

请始终按照医生的指示准确服用 Uro-Vaxom。如果您不确定，请咨询您的医生或药剂师。

除非医生另有指示，否则通常剂量为： 每天一粒胶囊。

使用方法和持续时间

在空腹时早餐前半小时服用服用 Uro-Vaxom。

用于基础免疫： 每天一粒胶囊，持续 3 个月。

用于刺激身体免疫系统： 在完成基础免疫三个月后的三个连续月中，每天服用一粒胶囊，每次持续 10 天。 如有需要，可以进行进一步的刺激或治疗周期。 对于在 Uro-Vaxom 免疫治疗期间仍然出现的反复发作的急性尿路感染，应像往常一样使用适当的抗生素或尿路消毒剂进行治疗。 如果您忘记服用 Uro-Vaxom 如果忘记单次剂量，请在第二天正常服用一粒。服用双倍剂量是没有意义的。

4.Uro-Vaxom 可能会有哪些副作用？

和所有药物一样，Uro-Vaxom 可能会引起副作用，但不一定会发生在每个人身上。 在治疗开始时，通常会出现轻微的胃肠道紊乱，偶尔会出现局限性过敏性皮肤变化和轻微发热。如果您受到列出的任何副作用的严重影响，或者您注意到未在本使用说明中列出的副作用，请告知您的医生或药剂师。

5.Uro-Vaxom 的储存方式是什么？

请将药品放在儿童无法触及的地方。 注意保质期，不要服用过期药品。

存储条件： 不要超过 25 ° C 存放。



德国代购 欢迎关注